HCB 和 HCB^- 的激发态光谱与态-态转化的理论研究*

曹泽星

田安民 鄢国森

(湖南师范大学化学系, 长沙 410081) (四川大学化学系, 成都 610064)

关键词: HCB, 激发态光谱, FOCI/MCSCF

HCB 是最简单的有机硼化合物, 理论上已有少量研究, 报导了部分激发态及其谐振动频率^[1]. 关于 HCB^- 及其异构体 HBC^- 的研究未见报导. 本文采用精确的量子化学计算方法, 对它们的激发态性质、光谱和态-态转化进行了系统的研究, 为实验上对这些物质的研究提供了一些有用的信息.

计算采用极化的三 Zeta 基组 (TZP) 进行基态和激发态的构型优化与振动性质调查. 各电子态相关能估算应用基于多组态自洽场分子轨道的一级组态相互作用 (FOCI/MCSCF) 方法. 计算过程中, 考虑到对称性破裂 (symmetry breaking) 的影响^[2], 对存在对称性破裂的体系采用相应的子群进行计算. 子群中电子态的符号注明在相应态的括号中.

从表 1 数据可以看出, 对 HCB 和 HBC , 三态 $^3\Pi(^3B_2)$ 是最稳定的. $\text{HCB}(^3\Pi)$ 与 $\text{HBC}(^3\Pi)$ 相比, 更稳定些. HCB^- 与 HBC^- 的基态都为 $^2\Sigma^+$. 从它们基态能量可以看出, HCB^- 异构体更稳定. 谐振动频率结果分析表明, HCB 除存在线性结构的稳定激发态外 (没有虚频), 还存在三角形 (C_s) 的稳定态与不同构型的过渡态 (TS). HCB^- 除线性构型的稳定态和三角形的过渡态外, 未找到其它构型的稳定态. 与这些过渡态对应的态-态转化能垒 (经零点振动能校正) 如下:

中性体系 (HCB)

态 I	TS	态 II	能垒 kcal · mol ⁻¹
$\text{H}-\text{B}-\text{C}(^3\Pi) \rightarrow \begin{array}{c} \text{H} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{B} \quad \text{C} \end{array} (^3A'')$		$\text{B}-\text{C}-\text{H}(^3\Pi)$	23.21
$\text{H}-\text{B}-\text{C}(^1\Sigma^+(^1A_2)) \rightarrow \begin{array}{c} \text{H} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{B} \quad \text{C} \end{array} (^1A')$		$\text{B}-\text{C}-\text{H}(^1A')$	21.09
$\text{H}-\text{B}-\text{C}(^1\Delta_1) \rightarrow \begin{array}{c} \text{H} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{B} \quad \text{C} \end{array} (^1A')$		$\text{B}-\text{C}-\text{H}(^1A')$	12.97
$\text{B}-\text{C}-\text{H}(^1A') \rightarrow \text{B}-\text{C}-\text{H}(^1\Delta_1) \rightarrow \text{B}-\text{C}-\text{H}(^1A')$			39.9

1994-01-27 收到初稿, 1994-03-18 收到修改稿. 联系人: 曹泽星. * 国家自然科学基金和国家教委博士点基金资助项目

从上面能垒数据可以看出, 态-态转化能垒较小, 各态间转化易进行. 因此, HCB 及其阴离子体系, 在结构上具有“拓扑自由性”, 与其它小元素簇体系类似.

表 1 基态和激发态的平衡结构、总能量与谐振动频率^{a)}
 Table 1 Optimized geometries, total energies and harmonic frequencies of the ground and excited states^{a)}

State	Geometry	E_{FOCI}	Vibrational frequencies
HCB($C_{\infty v}$)			
$^1\Sigma^+$	CB=1.2649 CH=1.0581	-62.966957	2152.5(1044, π) ^{b)} , 1981.6(10.53, σ) 3543.7(0.72, σ)
$^1\Delta(^1A_1)(\text{TS})$	CB=1.5037 CH=1.0669	-62.947483	298.1i(5.95, π), 105.3(11.06, π) 1173.9(4.54, σ), 3478.9(0.89, σ)
$^1\Sigma^+(^1A_2)$	CB=1.4976 CH=1.0669	-62.947380	3430.0(0.79, σ), 593.6(2.24, π) 1178.6(5.05, σ)
$^3\Sigma^-$	CB=1.5036 CH=1.0690	-62.99180	483.7(1.86, π), 1153.8(5.36, σ) 3397.5(0.57, σ)
$^3\Pi(^3B_2)$	CB=1.3424 CH=1.0595	-63.018708	586.2(2.36, π), 779.5(0.94, π) 1682.8(0.26, σ), 3523.2(0.88, σ)
HCB(C_s)			
$^1A'(\text{TS})$	CB=1.3654 CH=1.4624 $\angle \text{HCB}=53.62$	-62.981046	1081.9i(10.94, a'), 1570.2(1.46, a') 2326.1(1.40, a')
$^1A'$	CB=1.3946 CH=1.0810 $\angle \text{HCB}=128.7$	-63.012182	641.7(15.03, a'), 1275.8(4.84, a') 3319.7(0.21, a)
$^1A''$	CB=1.4565 CH=1.0696 $\angle \text{HCB}=143.87$	-62.992548	587.1(1.26, a'), 841.8(17.09, a') 3425.4(0.06, a')
$^1A''(\text{TS})$	CB=1.4307 CH=1.4658 $\angle \text{HCB}=53.23$	-62.934134	847.5i(5.15, a'), 1413.3(0.08, a') 2196.2(0.22, a')
HBC($C_{\infty v}$)			
$^1\Sigma^+$	CB=1.2931 BH=1.1633	-62.945708	847.4(0.74, π), 1761.7(3.84, σ) 2944.5(0.45, σ)
$^1\Delta(^1A_1)$	CB=1.4412 BH=1.1665	-62.992469	658.6(0.32, π), 671.1(3.83, π) 1409.7(0.02, σ), 2919.2(0.13, σ)

(to be continued)

Table 1 (cont.)

State	Geometry	E_{FOCI}	Vibrational frequencies
HBC($C_{\infty v}$)			
$^1\Sigma^+(^1A_2)$	CB=1.4282 BH=1.1672	-62.971919	532.3(1.78, π), 1435.9(0.09, σ) 2944.2(0.20, σ)
$^3\Sigma^-$	CB=1.4248 BH=1.1688	-63.000768	513.3(2.29, π), 1440.9(0.13, σ) 2901.4(0.29, σ)
$^3\Pi(^3B_2)$	CB=1.3664 BH=1.1643	-63.006354	360.7(0.00, π), 802.5(0.62, π) 1464.0(0.07, σ), 2928.8(0.10, σ)
HBC(C_s)			
$^3A''(\text{TS})$	CB=1.4201 CH=1.5327 $\angle \text{HCB}=51.21$	-62.965193	968.1i(5.29, a'), 1471.8(0.11, a') 2247.8(0.19, a')
HCB$^-(C_{\infty v})$			
$^2\Sigma^+$	CB=1.3379 CH=1.0621	-63.080456	463.8(2.41, π), 1525.1(1.47, σ) 3462.7(0.45, σ)
$^2\Pi(^2B_2)$	CB=1.4078 CH=1.0662	-63.052791	397.1(5.97, σ), 901.4(16.44, π) 1417.7(4.13, σ), 3422.4(0.03, σ)
HBC$^-(C_{\infty v})$			
$^2\Sigma^+$	CB=1.3436 BH=1.1791	-63.063559	168.2(0.00, π), 1487.5(1.37, σ) 2786.2(0.66, σ)
$^2\Pi(^2B_2)$	CB=1.3856 BH=1.1827	-63.061186	576.2(1.80, π), 606.9(1.25, π) 1522.4(0.22, σ), 2769.9(1.61, σ)
HBC$^-(C_s)$			
$^2A'(\text{TS})$	CB=1.3962 CH=1.5712 $\angle \text{HCB}=50.13$	63.032280	868.4i(4.32, a'), 1444.4(0.96, a') 2235.6(1.64, a')
$^2A''(\text{TS})$	CB=1.4382 CH=1.7178 $\angle \text{HCB}=46.45$	63.005946	991.8i(4.85, a'), 1340.6(0.52, a') 2224.4(0.78, a')

a) Bond distances in Å, angles in degree, total energies in hartree, and frequencies in cm^{-1}

b) Values in parenthesis are IR intensities in $42.255\text{km}\cdot\text{mol}^{-1}$

计算结果还表明, 对称性破裂体系中, 不仅简并轨道或简并态的能级发生分裂, 而且简并振动频率(如表 1 中的 π 模式)也发生了分裂. 这对实验上研究对称性破裂现象提供了理论信息.

本文首次给出了 HCB、HBC 的部分激发态及 HCB $^-$ 和 HBC $^-$ 的高级 *ab initio* 计算结果. 讨论了它们结构上的“拓扑自由性”、对称性破裂现象及相关态的态-态转化. 为实验上进一步考察这些化合物的激发态性质提供了理论依据.

参 考 文 献

- 1 Luke B T, Pople J A. *Chem. Phys. Letters*, **1985**, **122**:19
- 2 Liang C, Scheafer III H F. *Chem. Phys. Letters*, **1990**, **169**:150

Theoretical Studies of Spectra of the Excited States and Conversion Barriers of a State to State for HCB and HCB⁻

Cao Zexing

(Department of Chemistry, Hunan Normal University, Changsha 410081)

Tian Anmin Yan Guosen

(Department of Chemistry, Sichuan University, Chengdu 610064)

Abstract The low-lying singlet and triplet states of HCB and HBC, and doublet states of HCB⁻ and HBC⁻ are examined using *ab initio* molecular orbital theory at the HF/TZP, FOCI/MCSCF level. For the neutral molecules, several new low-lying electronic states are found, and the linear triplet structures are found to have the lowest energy. For the anions, the $^2\Sigma^+$ states are lower in energy than the $^2\Pi$ states. For HCB, the $^3\Pi$ state is 15.38 kcal·mol⁻¹ more stable than the $^3\Sigma^-$ state, and for HBC the $^3\Pi$ is 2.51 kcal·mol⁻¹ below the $^3\Sigma^-$ state at the first order configuration interaction (FOCI) level. The barriers of the conversion of HBC($^3\Pi$) to HCB($^3\Pi$), HBC($^1\Delta(^1A_1)$) to HCB($^1A'C_s$) and HBC($^1\Delta(^1A_2)$) to HCB($^1A''C_s$) are 23.21, 12.97 and 21.09 kcal·mol⁻¹, respectively. The activation energies of the conversion of HCB⁻($^2\Sigma^+$) to HCB($^2\Sigma^+$) and HCB⁻($^2\Pi$) to HBC⁻($^2\Pi$) are 18.13 and 25.88 kcal·mol⁻¹, respectively. A symmetry breaking phenomenon is observed in several states. The harmonic vibrational frequencies of the neutral molecules and the anions are also reported to provide information for the possible experimental observation of these species.

Keywords: HCB, Spectra of excited states, FOCI/MCSCF

补遗: 本刊 1994, 10(2):131 刘春万等文章中漏图, 现补如下, 并向作者致歉.

图 1 帽硫 3d 轨道与 Co 价轨道之间的成键作用
Fig.1 Bonding interaction between 3d-orbitals of capping sulfur and the valent orbitals of Co