Si₂ 分子基态和低激发态的电子结构*

张敬来 曹泽星 顾健德 田安民 鄢国森
(四川大学化学系, 成都 610064)

关键词: Si₂ 分子, 从头算, 相关能, 激发态

本文用 *ab initio* SOCI/MCSCF//HF/DH+d 方法计算得到了 Si₂ 分子的基态和八个激发态的平衡几何构型、总能量、谐振动频率、零点能以及各个态的势能曲线。讨论了各态键长随电子组态的变化关系, 指出了成键轨道中 π 电子数的增加, 是引起键长及谐振动频率变化的重要因素。其中 $^3\Pi_g$, $^5\Sigma_u^-$, $^3\Delta_u$, $^3\Sigma_u^-$, 未见有关文献报导。

图1 Si₂ 基态和激发态的势能曲线
Fig.1 Potential curves for the ground state and excited states of Si₂

由于硅簇合物的重要应用价值, 人们已对其进行了一些实验和理论研究^[1,2]。以前的研究主要是讨论其成键性质。由于 Si₂ 分子结构的特殊性, 要想全面了解其成键性质, 不仅要研究其基态的电子结构, 而且还要研究其激发态的电子结构。Si₂ 分子的电子结构比较复杂, 大多数实验测定和理论计算得出, $^3\Sigma_g^- (4\sigma_g^2 4\sigma_u^2 5\sigma_g^2 2\pi_u^2)$ 态是 Si₂ 的基态, 但 $^3\Pi_u (4\sigma_g^2 4\sigma_u^2 5\sigma_g^2 2\pi_u^3)$ 态的能量与之非常接近, 仅比前者高 0.2-1.0 eV^[3]。也有作者认为 Si₂ 的基态是 $^3\Pi_u$ 态而不是 $^3\Sigma_g^-$ 态^[4]。为了考察 Si₂ 的基态和激发态的性质, 有必要对其激发态进行进一步研究。

1 计算方法

Si₂ 的基态和激发态由改变 UHF/RHF 波函数的初始猜测得到。平衡结构参数由 HF/DH+d 能量梯度法得到。DH 为 Dunning/Hay 基组, d 为极化函数 ($\alpha_d=0.72$)。相关能计算采用基于 MCSCF 分子轨道的 SOCI 方法。以上计算的组合标记为 SOCI/MCSCF//HF/DH+d

对于具有二个或三个 π 价电子的态, 计算中均采用 D_{2h} 对称性。计算结果列于表 1, 表 2。势能曲线见图 1。计算是用 GAMESS-90 程序完成的^[7]。为了找出尽可能多的 Si₂ 激发态而又不花费过多的机时, 因此我们采用了上述基组。

1993-12-28 收到初稿, 1994-03-26 收到修改稿。联系人: 田安民。* 高等学校博士学科点专项基金和国家自然科学基金资助项目

表 1 Si₂ 各态的总能 (Hartree)Table 1 Total energy for the ground and excited states of Si₂ (hartree)

State	Configuration state	HF/DH+d	MCSCF	CI
$^3\Sigma_g^-$	$\sigma_g^2\sigma_u^2\sigma_g^2\pi_u^2$	-577.7230 -577.7191*	-577.7745	-577.7944
$^3\Pi_u$	$\sigma_g^2\sigma_u^2\sigma_g^1\pi_u^3$	-577.7051 -577.70105*	-577.7588	-577.7892
$^3\Sigma_g^+$	$\sigma_g^2\sigma_u^2\pi_u^4$	-577.6385 -577.6348*	-577.7599	-577.7715
$^1\Pi_u$	$\sigma_g^2\sigma_u^2\sigma_g^1\pi_u^3$	-577.7015	-577.7281	-577.7600
$^1\Delta_g$	$\sigma_g^2\sigma_u^2\sigma_g^2\pi_u^2$	-577.6811	-577.7606	-577.7780
$^3\Pi_g$	$\sigma_g^2\sigma_u^2\sigma_g^1\pi_u^3$	-577.5495	-577.6665	-577.6916
$^5\Sigma_u^-$	$\sigma_g^2\sigma_u^2\sigma_g^1\sigma_u^1\pi_u^2$	-577.5986	-577.6605	-577.6701
$^3\Delta_u$	$\sigma_g^2\sigma_u^2\sigma_g^1\sigma_u^1\pi_u^2$	-577.5503	-577.5542	-577.5743
$^3\Sigma_u^-$	$\sigma_g^2\sigma_u^2\sigma_g^1\pi_u^2$	-577.4950	-577.5669	-577.5863

* From [4]

2 结果和讨论

图 1 是 Si₂ 分子各电子态的势能曲线图。从该图可知, 在我们所计算的最大核间距为 18.90a.u. 的较大范围内, 没有出现其它稳定点或亚稳定点, 这表明所得各态的平衡点是可靠的。每条曲线各计算了 30 个点, 在平衡点附近取点较密。各势能曲线间有较多的交叉, 这是 Si₂ 复杂的电子结构的反映。从表 1 和表 2 的计算结果可以看到, 具有 $\sigma_g^2\sigma_u^2\sigma_g^2\pi_u^2$ 价组态的 $^3\Sigma_g^-$ 态, 无论是自洽场能量或 CI 能量都是各态中最底的, 与文献^[1,2] 的结论一致。该态具有二个 π 价电子, 其键长为 4.2127a.u., 与同样具有二个 π 价电子的 $^1\Delta_g$ ($4\sigma_g^24\sigma_u^25\sigma_g^22\pi_u^2$) 态的键长相近; 而 $^3\Pi_u$ ($4\sigma_g^24\sigma_u^25\sigma_g^12\pi_u^3$) 态, $^3\Pi_g$ ($4\sigma_g^24\sigma_u^25\sigma_g^12\pi_u^3$) 态, 和 $^1\Pi_u$ ($4\sigma_g^24\sigma_u^25\sigma_g^12\pi_u^3$) 态都有三个 π 价电子, 其键长分别为 3.9783a.u., 3.8686a.u. 和 4.0405a.u., 比具有二个 π 价电子的 $^3\Sigma_g^-$ 态和 $^1\Delta_g$ 态的键长都要短。 $^1\Sigma_g^+$ ($4\sigma_g^24\sigma_u^22\pi_u^4$) 态具有 4 个 π 价电子, 其键长为 3.8807a.u., 比基态 $^3\Sigma_g^-$ 的键长更短。从这些态的键长变化可以看出, 随着 π 价电子的增加, 其键长变短。这可由 π 电子的成键作用增强来解释。从我们的计算所得各态的谐振动频率的结果可以看出, 对能量较低的激发态, 具有相同 π 电子的各态, 其键长相差不大, 谐振动频率也相近。随着 π 电子数的增加, 键长变短, 谐振动频率相应增大。 Si₂, C₂ 和 SiC 等具有相同的价电子数, 比较它们的基态和激发态可看出它们之间的差别。 Ballik 和 Ramsay^[8] 等确认 $^1\Sigma_g^+$ ($3\sigma_g^01\pi_u^4$) 态是 C₂ 的基态, $^3\Pi_u$ ($3\sigma_g^11\pi_u^3$) 和 $^3\Sigma_g^-$ ($3\sigma_g^21\pi_u^2$) 态分别比基态能量高 0.089eV 和 0.798eV, 分别有四个, 三个和二一个 π 价电子, 键长和频率分别为 2.3875a.u., 1862cm⁻¹; 2.5242a.u., 1651cm⁻¹ 和 2.5293a.u., 1476cm⁻¹。很明显, 也是随着 π 电子的增加, 键长变短, 频率变大。其原因是半径比 Si 小得多的 C 更能使 π 价电子最大程度的成键。对于 SiC 分子, Brazier^[6] 等得出 $^3\Pi$ ($5\sigma^26\sigma^27\sigma^12\pi^3$) 态 (键长: 3.3081a.u., 频率: 914cm⁻¹) 是其基态, $^3\Sigma^-$ ($5\sigma^26\sigma^27\sigma^22\pi^2$) 态是其第一激发态, 二者能量相差 0.558eV, 而 $^1\Sigma^+$ ($5\sigma^26\sigma^22\pi^4$) 态 (键长: 3.4405a.u., 频率: 960cm⁻¹) 比两个三态的能量都高, 这说明 SiC 中 π 轨道的成键作用较弱, σ 轨道的成键作用较强, 使得 σ 轨道的成键贡献对分子的稳定性起决定作用。

表 2 Si_2 的键长 l , 振动频率 ($\tilde{\nu}$) 和零点能 E_0 (HF/DH+d)
Table 2 Equilibrium geometries (l), harmonic vibrational frequencies ($\tilde{\nu}$) and zero point vibrational energy E_0 (HF/DH+d) of Si_2

State	$l/\text{\AA}$	$\tilde{\nu}/\text{cm}^{-1}$	$E_0/\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$
$^3\Sigma_g^-$	4.2127	571.3	3.43
	4.2098*	568.0*	3.35*
$^1\Sigma_g^+$	3.8807	636.0	3.81
	3.8790*	593.0*	3.35*
$^3\Pi_u$	3.9783	605.8	3.43
	4.0510*	593.0*	3.35*
$^1\Pi_u$	4.0405	612.8	3.68
$^1\Delta_g$	4.2667	552.1	3.31
$^3\Pi_g$	3.8686	750.0	4.43
$^5\Sigma_u^-$	6.0439	184.0	1.09
$^3\Delta_u$	6.3248	177.0	1.05
$^3\Sigma_u^-$	5.1267	229.2	1.13

* From [4]

参 考 文 献

- 1 Raghavachari K. *Phase Trans.*, **1990**, **24**: 61
- 2 Raghavachari K. *J. Chem. Phys.*, **1988**, **89**: 2219
- 3 Kitsopowos T N. *J. Chem. Phys.*, **1991**, **95**: 1441
- 4 Raghavachari K. *J. Chem. Phys.*, **1986**, **84**: 5672
- 5 Ballik E A. *Astrophys J.* **1963**, **137**: 61; 84
- 6 Erazier C R. *J. Chem. Phys.*, **1989**, **91**: 7384
- 7 Schmidt M W, Balbridge K K, Boatz J A, et al. New Version of GAMESS, QCPE BULL, **1990**, **10**: 52
- 8 Watts J D, Bartlett R J. *J. Chem. Phys.*, **1992**, **96**: 6073

Electronic Structure for the Ground and Excited State of Si_2

Zhang Jinglai Cao Zexing Gu Jiande Tian Anmin Yan Guosen
(Department of Chemistry, Shichuan University, Chengdu 610064)

Abstract Using *ab initio* molecular orbital theory at the SOCI/MCSCF/HF/DH+d level, the equilibrium geometries, total energies, harmonic vibrational frequencies, zero point vibrational energy and potential energy curves of the ground state and 8 excited states of Si_2 molecule were obtained. The relationship between the bond length and the electronic configuration of the state was discussed. The results revealed that bond length and the harmonic vibrational frequency of the molecule strongly depended upon the number of π -electrons in the bonding MO's. The reported states $^3\Pi_g$, $^5\Sigma_u^-$, $^3\Delta_u$, $^3\Sigma_u^-$ have not been seen in literatures.

Keywords: Si_2 , *Ab initio* calculation, SOCI, MCSCF, Excited state